

# ¿QUÉ SINTOMAS NOS DEBEN DE ALARMAR? TCE

Debemos comenzar a alarmarnos



# SI...

- ... la caída es de más de 1 metro de altura descontando la talla del niño.
- ... el niño es menor de 1 año.
- ... comienza a tener convulsiones.
- ... no responde a la llamada ni a estímulos
- ... sufre palpitaciones o respiración de manera acelerada de forma persistente
- ... se produce pérdida del conocimiento por breve que sea.
- ... tiene las pupilas dilatadas o de distinto tamaño
- ... encontramos algún hematoma debajo de los ojos y/o detrás de las orejas.
- ... comienza a tener dolor de cabeza intenso y progresivo que no cesa a pesar de la analgesia
- ... sufre amnesia (no recuerda el golpe o lo que sucedió después)
- ... el mareo es cada vez más acentuado.
- ... muestra alguna postura extraña: está rígido
- ... vómita de manera repetida (más de 3) o intensa
- ... sufre somnolencia persistente (distinta al sueño normal) o dificultad para despertar al niño.
- ... su estado es confuso o desorientado, o cambios en el comportamiento
- ... tiene un gran hematoma en la cabeza o zona hundida del cráneo
- ... siente debilidad en un brazo o una pierna. Dificultad para caminar o para utilizar las manos.
- ... nota cualquier anomalía de la visión que antes no tuviera
- ... le sale sangre o un líquido claro por la nariz o el oído
- ... presenta cualquier otro signo o síntoma que le preocupe.

Dra. Mª José Torres Ralero  
Col: 28 / 56469